



EN NSTRUCTION FOR USE
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
FR MODE D'EMPLOI
IT ISTRUZIONI PER L'USO
ES INSTRUCCIONES DE USO
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DA BRUGSANVISNINGEN
ET KASUTUSJUHEND
FI Käyttöohjeet
EL Οδηγίες χρήσης
HR UPUTE ZA UPORABU
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
SL NAVODILA ZA UPORABO
SK NÁVOD NA POUŽITIE
SV BRUKSANVISNING

LustGlider

EN IMPORTANT POINTS TO KNOW BEFORE USING A CONDOM
 1. If extra lubrication is needed, use water-based lubricants. 2. Do not use oil based lubricants such as petroleum jelly, mineral oils and cold creams, as they may weaken the condom and cause subsequent failure of the product. So can some topical medicines that are applied to the penis or vagina. If you are not sure about the effect of the medicines you're using on condoms, ask your doctor or pharmacist. 3. Do not use the condom if the rubber material is sticky or brittle. If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from undamaged package. 4. Seek medical assistance as soon as possible, at least within 72hour should a condom leak or burst during use. 5. Condoms are for single use only, reused condom could increase the risk of breakage and infection. 6. When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the risk of transmitting HIV/AIDS and other sexually transmitted infections. 7. No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV and STIs. If you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your doctor immediately. 8. This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock. If you are allergic to natural rubber latex products, consult your doctor for advice before use. 9. Store in a cool dry place away from direct sunlight. 10. Keep away from children. 11. There is a risk of choking using condoms orally. 12. The use of additional lubricants during anal sex can reduce the risk of breakage. 13. Condom is a medical device to be used by lay persons - adult male or female. 14. Report any serious incident occurred from using the device to the manufacturer and the relevant competent authority. 15. These condoms conform to International standards ISO 4074/ EN ISO 4074.

(1) Carefully tear off foil pack, making sure not to damage the condom. (2) During removal from foil, avoid damage to the condom by fingernails, jewelry and etc. (3) Squeeze the reservoir end of the condom gently, between the thumb and the forefinger to expel the air out of the tip, while placing the condom over the head of the erect penis. This must be done before any contact occurs between the penis and the partner's body to assist in the prevention of sexually transmitted infections and pregnancy. (4) While still holding the reservoir tip, unroll the condom over the entire length of the erect penis with the other hand. (5) Stop and check if the condom slipping off or tightening excessively onto the penis as this might lead to breakage. (6) After ejaculation, hold on the rim of the condom and slowly withdraw the penis while it is still erect so that the condom does not slip off. (7) Remove the condom from your penis by sliding it off slowly. It is important not to permit the penis or used condom to touch the vagina area after withdrawal. (8) Wrap the used condom and dispose it hygienically in a closed rubbish bin.

DE WICHTIGE HINWEISE, BEVOR SIE EIN KONDOM VERWENDEN
 1. Wenn zusätzliches Gleitmittel erforderlich ist, verwenden Sie wasserbasiertes Gleitmittel. 2. Verwenden Sie keine ölartigen Gleitmittel, Mineralöle und Körpercremes, da diese das Kondom schwächen und zu einem späteren Versagen des Produkts führen können. Dies gilt auch für einige topische Medikamente, die auf den Penis oder die Vagina angewendet werden. Wenn Sie sich über die Wirkung der Arzneimittel, die Sie in Verbindung mit Kondomen anwenden, unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 3. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn das Gummimaterial klebrig oder brüchig ist. Wenn der einzelne Behälter offensichtlich beschädigt ist, entsorgen Sie das Kondom und verwenden Sie ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. 4. Suchen Sie so bald wie möglich oder mindestens innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf, falls ein Kondom während des Gebrauchs ausläuft oder platzt. 5. Kondome sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Wiederverwendete Kondome können das Risiko von Beschädigung und Infektion erhöhen. 6. Bei richtiger Anwendung bei jedem Geschlechtsverkehr helfen Latexkondome eine Schwangerschaft zu verhindern und das Risiko der Übertragung von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten zu verringern. 7. Keine Verhütungsmethode kann einen hundertprozentigen Schutz gegen Schwangerschaft oder Übertragung von HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten bieten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie oder Ihr Partner schwanger sind oder infiziert wurden, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. 8. Dieses Produkt enthält Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich einem anaphylaktischen Schock hervorrufen kann. Wenn Sie allergisch gegen Naturlatexprodukte sind, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt. 9. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 10. Von Kindern fernhalten. 11. Bei der oralen Anwendung von Kondomen besteht die Gefahr des Erstickens. 12. Die Verwendung zusätzlicher Gleitmittel beim Analverkehr kann das Risiko von Beschädigungen verringern. 13. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für erwachsene Männer oder Frauen. 14. Melden Sie jeden schwerwiegenden Zwischenfall, der bei der Verwendung des Geräts auftritt, dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde. 15. Diese Kondome entsprechen den internationalen Normen ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Folienpackung vorsichtig aufreißen und dabei darauf achten, dass das Kondom nicht beschädigt wird. (2) Vermeiden Sie beim Entfernen der Folie eine Beschädigung des Kondoms durch Fingernägel, Schmuck usw. (3) Drücken Sie das Reservoirende des Kondoms vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger, um die Luft aus der Spitze zu entfernen, während Sie das Kondom über den Kopf des erigierten Penis legen. Dies muss erfolgen, bevor ein Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners entsteht, um sexuell übertragbare Infektionen und Schwangerschaften zu verhindern. (4) Während Sie die Reservoirspitze halten, rollen Sie das Kondom mit der anderen Hand über die gesamte Länge des erigierten Penis ab. (5) Prüfen Sie, ob das Kondom vom Penis abrutscht oder zu fest sitzt, da dies zu einer Beschädigung führen kann. (6) Halten Sie nach der Ejakulation den Rand des Kondoms fest und ziehen Sie den Penis langsam heraus, während er noch erigiert ist, damit das Kondom nicht abrutscht. (7) Entfernen Sie das Kondom von Ihrem Penis, indem Sie es langsam abziehen. Es ist wichtig, dass der Penis oder das benutzte Kondom nach dem Abziehen nicht den Vaginalbereich berührt. (8) Wickeln Sie das gebrauchte Kondom ein und entsorgen Sie es hygienisch in einem geschlossenen Müllimer.

FR REMARQUES IMPORTANTES AVANT D'UTILISER UN PRÉSERVATIF
 1. Si un lubrifiant supplémentaire est nécessaire, utiliser un lubrifiant à base d'eau. 2. N'utilisez pas de lubrifiants à base d'huile, d'huile minérale ou de crèmes pour le corps, car ceux-ci affaiblissent le préservatif et peuvent entraîner une défaillance ultérieure du produit. Il en va de même pour certains médicaments topiques appliqués sur le pénis ou le vagin. Si vous n'êtes pas sûr de l'effet des médicaments que vous utilisez en combinaison avec des préservatifs, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 3. N'utilisez pas le préservatif si le matériau en caoutchouc est collant ou cassant. 4. Si l'emballage individuel est manifestement endommagé, jetez le préservatif et utilisez-en un nouveau dans un emballage intact. 4. Consultez un médecin dès que possible ou au moins dans les 72 heures si un préservatif fuit ou éclate pendant son utilisation. 5. Les préservatifs sont à usage unique. 6. Les préservatifs réutilisés peuvent augmenter le risque de dommages et d'infection. 7. Aucune méthode de contraception ne peut offrir une protection à 100 % contre la grossesse ou la transmission du VIH et des maladies sexuellement transmissibles. Si vous pensez que vous ou votre partenaire êtes enceinte ou avez été infectée, consultez immédiatement votre médecin. 8. Ce produit contient du latex naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique. Si vous êtes allergique aux produits en latex naturel, consultez votre médecin avant de les utiliser. 9. Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. 10. Conservez hors de portée des enfants. 11. L'utilisation de préservatifs par voie orale présente un risque d'étouffement. 12. L'utilisation de lubrifiants supplémentaires lors de rapports anaux peut réduire le risque de dommages. 13. Un préservatif est un dispositif médical destiné à des non-professionnels - hommes ou femmes adultes. 14. signalez au fabricant et à l'autorité compétente concernée tout incident grave survenu lors de l'utilisation du dispositif. 15. Ces préservatifs sont conformes aux normes internationales ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Déchirer délicatement l'emballage en aluminium en veillant à ne pas endommager le préservatif. (2) Lors du retrait du film, évitez d'endommager le préservatif avec les ongles, les bijoux, etc. (3) Pressez délicatement l'extrémité du réservoir du préservatif entre le pouce et l'index pour évacuer l'air de l'extrémité, tout en plaçant le préservatif sur la tête du pénis en érection. Cette opération doit être effectuée avant qu'un contact ne s'établisse entre le pénis et le corps du partenaire, afin de prévenir les infections sexuellement transmissibles et les grossesses. (4) Tout en tenant l'extrémité du réservoir, déroulez le préservatif de l'autre main sur toute la longueur du pénis en érection. (5) Vérifiez que le préservatif ne glisse pas du pénis ou qu'il n'est pas trop serré, car cela pourrait l'endommager. (6) Après l'éjaculation, tenez le bord du préservatif et retirez lentement le pénis alors qu'il est encore en érection afin que le préservatif ne glisse pas. (7) Retirez le préservatif de votre pénis en le tirant lentement. Il est important que le pénis ou le préservatif usagé ne touchent pas la zone vaginale après le retrait. (8) Enveloppez le préservatif usagé et jetez-le de manière hygiénique dans un cubo de basura cerrado.

IT CONSIGLI IMPORTANTI PRIMA DI USARE IL PRESERVATIVO
 1. Se è necessario un lubrificante aggiuntivo, utilizzare un lubrificante a base d'acqua. 2. Non utilizzare lubrificanti a base di olio, olio minerale e creme per il corpo, poiché questi prodotti indeboliscono il preservativo e possono causare l'immalfunzionamento. Questo vale anche per alcuni farmaci topici da applicare sul pene o sulla vagina. Se non siete sicuri dell'effetto del farmaco che state usando insieme al preservativo, chiedete al vostro medico o al farmacista. 3. Non usare il preservativo se il materiale di gomma è appiccicoso o fragile. Se il contenitore individuale è evidentemente danneggiato, smaltire il profilattico e utilizzarne uno nuovo dalla confezione integra. 4. consultare un medico il prima possibile o almeno entro 72 ore se il preservativo perde o si rompe durante l'uso. 5. I preservativi sono destinati a un solo uso. Il riutilizzo dei preservativi può aumentare il rischio di danni e infezioni. 6. Se è usato correttamente ogni volta che si ha un rapporto sessuale, il preservativo in lattice aiuta a prevenire la gravidanza e a ridurre il rischio di trasmissione dell'HIV/AIDS e di altre infezioni sessualmente trasmissibili. 7. Nessun metodo contraccettivo può offrire una protezione al 100% contro la gravidanza o la trasmissione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili. Se si sospetta una gravidanza o un'infezione, contattare immediatamente il medico. 8. Questo prodotto contiene lattice naturale che può causare reazioni allergiche, tra cui lo shock anafilattico. Se si è allergici ai prodotti in lattice naturale, consultare il medico prima dell'uso. 9. Conservare in un luogo fresco e asciutto e proteggere dalla luce solare diretta. 10. tenere lontano dai bambini. 11. esiste il rischio di soffocamento quando si usa il profilattico per via orale. 12. L'uso di lubrificanti aggiuntivi durante i rapporti anali può ridurre il rischio di danni. 13. Il preservativo è un dispositivo medico per profani, uomini o donne adulti. 14. segnalare al produttore e alle autorità competenti qualsiasi incidente grave che si verifichi durante l'uso del dispositivo. 15. Questi profilattici sono conformi alle norme internazionali ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Aprire con cautela la confezione di pellicola, facendo attenzione a non danneggiare il profilattico. (2) Quando si rimuove la pellicola, evitare di danneggiare il profilattico con le unghie, i gioielli, ecc. (3) Stringere delicatamente l'estremità del serbatoio del profilattico tra il pollice e l'indice per eliminare l'aria dalla punta mentre si posiziona il profilattico sulla testa del pene eretto. Questa operazione deve essere eseguita prima che ci sia un contatto tra il pene e il corpo del partner, per evitare infezioni sessualmente trasmissibili e gravidanze. (4) Tenendo la punta del serbatoio, srotolare il preservativo con l'altra mano su tutta la lunghezza del pene eretto. (5) Controllare se il preservativo scivola via dal pene o se è troppo stretto, in quanto ciò può causare danni. (6) Dopo l'eiaculazione, tenete il bordo del preservativo e tirate lentamente fuori il pene ancora eretto, in modo che il preservativo non scivoli via. (7) Rimuovere il preservativo dal pene tirandolo lentamente. È importante che il pene o il preservativo usato non tocchino la zona vaginale dopo la rimozione. (8) Avvolgere il preservativo usato e smaltirlo in modo igienico in un bidone della spazzatura chiuso.

ES NOTAS IMPORTANTES ANTES DE UTILIZAR UN CONDÓN
 1. Si necesita lubricante adicional, utilice lubricante a base de agua. 2. No utilice lubricantes a base de aceite, aceite mineral ni cremas corporales, ya que pueden debilitar el preservativo y provocar un fallo posterior del producto. Esto también se aplica a algunos medicamentos tópicos que se aplican en el pene o la vagina. Si no está seguro del efecto del medicamento que utiliza junto con el preservativo, pregunte a su médico o farmacéutico. 3. No utilice el preservativo si el material de goma está pegajoso o quebradizo. Si el envase individual está evidentemente dañado, desechelo el preservativo y utilice uno nuevo de un envase no dañado. 4. Consulte a un médico lo antes posible, o al menos en un plazo de 72 horas, si un preservativo gotea o se rompe durante su uso. 5. Los preservativos son de un solo uso. La reutilización de los preservativos puede aumentar el riesgo de daños e infecciones. 6. Si se utilizan correctamente cada vez que se mantienen relaciones sexuales, los preservativos de látex ayudan a prevenir el embarazo y reducen el riesgo de contagio del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 7. Ningún método anticonceptivo puede proporcionar una protección del 100% contra el embarazo o la transmisión del VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Si sospecha que usted o su pareja están embarazados o han sido infectados, póngase en contacto con su médico inmediatamente. 8. Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluido el shock anafiláctico. Si es alérgico a los productos de látex natural, consulte a su médico antes de utilizarlo. 9. Conserve en lugar fresco y seco y protégelo de la luz solar directa. 10. Mantener fuera del alcance de los niños. 11. Existe riesgo de asfixia al utilizar preservativos por vía oral. 12. El uso de lubricantes adicionales durante el coito anal puede reducir el riesgo de daños. 13. El preservativo es un producto sanitario para personas legas, hombres o mujeres adultos. 14. Notifique cualquier incidente grave que se produzca durante el uso del dispositivo al fabricante y a la autoridad competente pertinente. 15. Estos preservativos cumplen las normas internacionales ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Abra el envoltorio de aluminio con cuidado de no dañar el preservativo. (2) Al retirar la lámina, evite dañar el preservativo con las uñas, joyas, etc. (3) Apriete suavemente el extremo del depósito del preservativo entre el pulgar y el índice para eliminar el aire de la punta mientras coloca el preservativo sobre la cabeza del pene erecto. Esto debe hacerse antes de que haya contacto entre el pene y el cuerpo de su pareja para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos. (4) Mientras sujeta la punta del depósito, desenrolle el preservativo con la otra mano sobre toda la longitud del pene erecto. (5) Compruebe si el preservativo resbala del pene o está demasiado apretado, ya que esto puede provocar daños. (6) Después de la eyacuación, sujete el borde del preservativo y tire lentamente del pene hacia fuera mientras sujeta erecto para que el preservativo no se salga. (7) Retire el preservativo del pene tirando de él lentamente. Es importante que el pene o el preservativo usado no toquen la zona vaginal después de retirarlo. (8) Envuelva el preservativo usado y deséchelo higiénicamente en un cubo de basura cerrado.

BG ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНДОМ
 1. ако е необходимо допълнително смазване, използвайте смазка на водна основа. 2. Не използвайте глицерин, минерални масла или кремове за тяло, тъй като те отслабват презерватива и могат да доведат до повреда на продукта. Това се отнася и за някои локални лекарства, които се прилагат върху пениса или вагината. Ако не сте сигурни в ефекта на лекарствата, които използвате заедно с презерватив, консултирайте Вашия лекар или фармацевт. 3. Не използвайте презерватива, ако гуменият материал е лепкав или чуплив. Ако индивидуалната опаковка е очевидно повредена, изхвърлете презерватива и използвайте нов от неповредена опаковка. 4. консултирайте се с лекар възможно най-скоро или поне в рамките на 72 часа, ако презервативът изтече или се счупи по време на употреба. 5. Презервативите са предназначени само за еднократна употреба. Повторната употреба на презервативите може да увеличи риска от увреждане и инфекции. 6. когато се използват правилно всеки път, когато правите секс, латексните презервативи помагат за предотвратяване на бременност и намаляват риска от предаване на ХИВ/СПИН и други инфекции, предавани по полов път. 7. Нито един метод на контрацепция не може да осигури 100% защита срещу бременност или предаване на ХИВ и болести, предавани по полов път. 8. Ако подозирате, че Вие или Вашият партньор сте бременни или сте се заразили, незабавно се свържете с Вашия лекар. 9. Съхранявайте на хладно и сухо място и предпазвайте от пряка слънчева светлина. 10. дръжте далеч от деца. 11. съществува риск от задушаване при орална употреба на презерватив. 12. Използването на допълнителни лубриканти по време на анален секс може да намали риска от увреждане. 13. презервативът е медицинско изделие, предназначено за непрофесионалисти - възрастни мъже или жени. 14. съобщавайте за всеки сериозен инцидент, възникнал по време на употребата на презерватива, на производителя и на компетентния орган. 15. тези презервативи са в съответствие с международните стандарти ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Внимателно разкъсвайте опаковката от фолио, като внимавате да не повредите презерватива. (2) Когато отстранявате фолиото, избягвайте да повредите презерватива с нокти, бижута и др. (3) Внимателно стиснете резервоария край на презерватива между палеца и показалеца си, за да отстраните въздуха от върха, докато поставите презерватива върху главата на еректирания пенис. Това трябва да се направи преди да има контакт и да е контакт между пениса и тялото на партньора ви, за да се предотвратят полово предавани инфекции и бременност. (4) Докато държите върха на резервоара, разгънете презерватива с другата ръка по цялата дължина на еректирания пенис. (5) Проверете дали презервативът не се изплъзва от пениса или не е прекалено стегнат, тъй като това може да доведе до увреждане. (6) След еякулация задържте ръба на презерватива и бавно издърпайте пениса, докато е все още еректирал, за да не се изплъзне презервативът. (7) Отстранете презерватива от пениса си, като го издърпате бавно. Важно е пенисът или използваният презерватив да не докосват вагиналната област след отстраняването. (8) Опаковките използвания презерватива и го изхвърляйте по хигиенен начин в затворена кофа за боклук.

CZ DŮLEŽITÉ RÁDY PŘED POUŽITÍM KONDOMU
 1. Pokud je zapotřebí další lubrikant, použijte lubrikant na vodní bázi. 2. Nepoužívejte lubrikaci gely na olejové bázi, minerální oleje a tělové krémy, protože tyto látky mohou kondomu oslabit a způsobit jeho poškození. Stejně tak platí i pro některé lokální léky, které se aplikují na penis nebo vagínu. Pokud si nejste jisti účinkem léků, které používáte ve spojení s kondomem, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 3. Nepoužívejte kondom, pokud je gumový materiál lepavý nebo křehký. Pokud je jednotlivý balení zjevně poškozené, kondom zlikvidujte a použijte nový z nepoškozeného obalu. 4. Pokud kondom během používání unikne nebo praskne, poraďte se co nejdříve nebo alespoň do 72 hodin s lékařem. 5. Kondomy jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití kondomů může zvýšit riziko poškození a infekce. 6. Při správném použití při každém sexuálním styku pomáhají latexové kondomy předcházet otěhotnění a snižují riziko přenosu HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcí. 7. Žádná antikoncepční metoda nemůže poskytnout stoprocentní ochranu před otěhotněním nebo přenosem HIV a pohlavně přenosných chorob. Pokud máte podezření, že jste jste v těhotné váš partner těhotní nebo jste neznázeli, neprodějte kontaktujte svého lékaře. 8. Tento výrobek obsahuje přírodní latex, který může způsobit alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Pokud jste alergičtí na výrobky z přírodního latexu, poraďte se před použitím s lékařem. 9. Skladujte na chladném a suchém místě s chráně před přímým slunečním zářením. 10. Uchovejte mimo dosah dětí. 11. Při perorálním použití kondomů hrozí nebezpečí udusení. 12. Použití dalších lubrikantů při análním styku může snížit riziko poškození. 13. Kondom je zdravotnický prostředek pro laiky - dospělá mužé nebo ženy. 14. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde při používání kondomu, nahleďte výrobci a příslušnému orgánu. 15. Tyto kondomy odpovídají mezinárodním normám ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Opatrně roztrhněte fóliové balení a dávejte pozor, abyste kondom nepoškodili. (2) Při odstraňování fólie se vyvarujte poškození kondomu nehty, šperky apod. (3) Jemně stiskněte konec zásobníku kondomu mezi palcem a ukazováčkem, abyste odstranili vzduch ze špičky a zároveň kondom nasadili na hlavku ztvořeného penisu. Toto je třeba provést před jakýmkoli kontaktem penis s tělem partnera, abyste předšli pohlavně přenosným infekcím a těhotenství. (4) Zatímco držíte špičku zásobníku, druhou rukou rozvinujte kondom po celé délce ztvořeného penisu. (5) Zkontrolujte, zda kondom nesklouzává z penisu nebo není příliš těsný, protože to může vést k poškození. (6) Po ejakulaci přidržete okraj kondomu a pomalu vytáhněte penis, dokud je stále vztyčen, aby kondom nesklouzl. (7) Kondom z penisu odstraňte tak, že jej pomalu stáhnete. Je důležité, aby se penis nebo použité kondom po sejmutí nedotýkali vaginální oblasti. (8) Kožerake kasutatud kondoom kokku ja visake see hügieeniseit suletud prügikasti.

DA VIGTIGE RÅD FØR BRUG AF KONDOM
 1. Hvis der er behov for ekstra glidecreme, så brug vandbaseret glidecreme. 2. Brug ikke oliebaserede glidecreme, mineralisk olie og kropscreme, da disse kan svække kondomet og medføre, at produktet senere svigter. Dette gælder også for nogle topiske lægemidler, der påføres penis eller vagina. Hvis du er i tvivl om virkningen af det medicin, du bruger sammen med kondomet, så spørg din læge eller apoteker. 3. Brug ikke kondomet, hvis gummimaterialet er klæbrigt eller skart. Hvis den enkelte beholder er tydeligt beskadiget, skal du smide kondomet ud og bruge et nyt fra en ubeskadiget emballage. 4. Søg læge så hurtigt som muligt eller i hvert fald inden for 72 timer, hvis et kondom lækker eller springer under brug. 5. Kondomer er kun beregnet til engangsbrug. Genbrug af kondomer kan give risiko for skader og infektion. 6. Når latexkondomer bruges korrekt, hver gang du har sex, hjælper de med at forhindre overført og reducere risikoen for at overføre hiv/aids og andre seksuelt overførte infektioner. 7. Ingen præventionsmetode kan give 100 procent beskyttelse mod graviditet eller overførelse af hiv og seksuelt overførte sygdomme. Hvis du har mistanke om, at du eller din partner er gravid eller er blevet smittet, skal du forske kontakte din læge. 8. Dette produkt indeholder naturlig latex, som kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk chok. Hvis du er allergisk over for naturlige latexprodukter, skal du kontakte din læge før brug. 9. Opbevares på et koldt, tørt sted og beskyltes mod direkte sollys. 10. Holdes væk fra børn. 11. Der er risiko for kvælning ved oral brug af kondomer. 12. Hvis kondom er et altsid glidecreme under analt samleje kan reducere risikoen for skader. 13. Et kondom er et medicinsk udstyrt til lægfolk - voksne mænd eller kvinder. 14. Rapportér enhver alvorlig hændelse, der opstår under brug af udstyrt, til producenten og den relevante kompetente myndighed. 15. Disse kondomer er i overensstemmelse med de internationale standarder ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Åbn forsigtigt foliepakken, og pas på ikke at beskadige kondomet. (2) Når du fjerner folien, skal du undgå at beskadige kondomet med negle, smykker osv. (3) Klem forsigtigt reservoirenden af kondomet mellem tommel- og pegefinger for at fjerne luften fra spidsen, mens du placerer kondomet over hovedet på den erigerede penis. Dette skal gøres, før der er kontakt mellem penis og din partners krop for at forhindre seksuelt overførte infektioner og graviditet. (4) Mens du holder på reservoirstoppen, rul ud kondomet ud med den anden hånd over hele længden af den erigerede penis. (5) Tjek, om kondomet glider af penis eller er for stramt, da det kan føre til skader. (6) Efter ejakulation skal du holde i kanten af kondomet og langsomt trække penis ud, mens den stadig er erigert, så kondomet ikke glider af. (7) Fjern kondomet fra din penis ved at trække det langsomt af. Det er vigtigt, at penis eller brugt kondom ikke rører ved skeden, når du har fjernet det. (8) Pak det brugte kondom ind, og smid det hygiejnisk ud i en lukket skraldespand.

ET OULUNE TEAVE ENNE KONDOMI KASUTAMIST
 1. Kui on vaja lisalubrikanti, kasutage veepehst lubrikanti. 2. Ärge kasutage õlipehst lubrikantsid, mineraalõliid ega kehakreeme, kuna need nõrgendavad kondomi ja võivad põhjustada toote hilisema rikke. See kehtib ka mõnede peenisele või tuppe kantavate paikse ravimite kohta. Kui te o teie kindel, kuidas teie kasutatavad ravimid kondoomidega koos toimivad, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. 3. Ärge kasutage kondomi, kui kummi materjal on kleppuv või hapraks muutunud. Kui üksikpakend on silmaga nähtavalt kahjustatud, visake kondom ära ja kasutage uut, mis on pakendist võetud. 4. Kui kondom kasutamise ajal lekkib või puruneb, pöörduge viivitamatult kindelt või vähemalt 72 tunni jooksul arsti poole. 5. Kondoomid on mõeldud üksiktoimeliseks kasutamiseks. Korduvasutatud kondomid võivad suurendada kahjustuste ja nakkuste riski. 6. Oige kasutamise korral aitavad latekskondoomid igal sugulisel vahetorkal rasedust vältida ja vähendada HIV/AIDS-i ja teiste sugulisel teel levivate nakkuste ühendamise riski. 7. Ükski rasedusvastane meetod ei paku 100% kaitses raseduse või HIV ja sugulisel teel levivate haiguste vastu. Kui kahtlustate, et teie või teie partner olete rase või nakatunud, pöörduge viivitamatult arsti poole. 8. See toode sisaldab looduslikku lateksi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sealhulgas anafülaktilist šokki. Kui olete allergiline loodusliku lateksi toodete suhtes, pöörduge enne kasutamist oma arstiga nõu. 9. Hoida külmades, kuivades kohas ja kaitses otse päikesevalguse eest. 10. Hoida laste käeulatuses eemal. 11. Kondomide suukaudselt kasutamisel on lämbumishoogu risk. 12. Lisalubrikandi kasutamine analaalselt ajal võib vähendada kahjustuste riski. 13. Kondom on meditsiiniseade täiskasvanud meeste teel naistele. 14. Teatage igast tõsisest vahetumisest, mis tekitab teie kasutamisel, tootjale ja asjaomaste ametiasutustele. 15. Need kondoomid vastavad rahvusvahelistele standarditele ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Avage klepakendi ettevaatlikult, et kondomi ei kahjustada. (2) Klepakendi eemaldamisel vältige kondomi kahjustamist sõrmküüntega, ehted jms abil. (3) Suruge kondomi reservuaari otsa ettevaatlikult pöidla ja nimetissõrmega vahele, et eemaldada otsast õhk, samal ajal kui asetate kondomi erektsioonile oleva peenise peale. See tuleb teha enne peenise ja partneri keha kokkupuudet, et vältida sugulisel teel levivate infektsioonide ja raseduse tekkimist. (4) Hoides reservuaari otsa, rullige kondomit teise käega erektsioonile oleva peenise pikkuse alla. (5) Kontrollige, et kondomi ei libiseks peenisel ega oleks liiga pingul, kuna see võib põhjustada 6) Pärast ejakulatsiooni hoide kondomit servast kiini ja tõmmake peenis aeglaselt välja, kui see on veel erektsioonil, et kondomi ei libiseks maha. (7) Eemaldage kondom enne, tõmmates seda aeglaselt maha. On oluline, et penis või kasutatud kondom ei puudutaks pärast eemaldamist tupe piirkonda. (8) Keerake kasutatud kondoom kokku ja visake see hügieeniseit suletud prügikasti.

FI TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA ENNEN KONDOMIN KÄYTTÖÄ
 1. Jos lisävoiteluainetta tarvitaan, käytä vesipohjaista voiteluainetta. 2. Älä käytä öljypohjaisia liukastetta, mineraaliöljyä tai vartalovoitelua, koska ne heikentävät kondomia ja voivat aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen myöhemmin. Tämä pätee myös joihinkin paikallisiin lääkkeisiin, jotta levitetään penikseen tai emättimien kanssa. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista. 3. Älä käytä kondomia, jos kumimateriaali on tahmeaa tai haaurasta. Jos yksittäispakkauksa on selvästi vaurioitunut, hävitä kondomi ja käytä uutta kondomia vahingottomattomasta pakkauksesta. 4. Ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian tai vähintään 72 tunnin kuluessa, jos kondomi vuotaa tai puhkeaa käytön aikana. 5. Kondom on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Kondomien uudelleenkäyttö voi lisätä vaurioitumisen ja tartuntariskin. 6. Kun latexkondomia käytetään oikein joka kerta, kun harastat seksiä, ne auttavat ehkäisemään raskautta ja vähentävät HIV:n/aidsin ja muiden sukupuoliteitse tartuttavien infektioiden tarttumiskiä. 7. Mikään ehkäisyväline ei voi tarjota 100 prosentin suojaa raskautta tai HIV:n ja sukupuoliteitse tartuttavista vaistaan. 8. Eväpait, ette sinä tai kumppanisi olette raskaana tai olette saaneet tartunnan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. 8. Tämä tuote sisältää luonnollista lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita, mukaan lukien anafylaktinen shock. Jos olet allerginen luonnollateksituotteille, ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä. 9. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa ja suojaa suorasta auringonvalolta. 10. Pidä poissa lasten ulottuvilta. 11. Kondomia suositellaan käytettäväksi on tukehtumisvaara. 12. Lisävoiteluaineen käyttö anafylaktisissa viivähtävissä vaurioituisi. 13. Kondomi on mallikoille - aikuisille miehille tai naisille - tarkoitettu lääkinällinen väline. 14. Ilmalta valmistettuja ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista laiteen käytön aikana sattuneista vakavista vaurioituneista. 15. Nämä kondomit ovat kansainvälisten standardien ISO 4074 / EN ISO 4074 mukaisia.

(1) Rev foliopakkauks varovasti auki vahingottomattomasta kondomia. (2) Kun irrotat foliota, vältä kondomin vaurioittamista kynsillä, koruilla jne. (3) Purista varovasti kondomin säiliöpäästä peukalon ja etusormen väisissä poistaaksesi ilmaa kärjestä samalla, kun asetat kondomin erektsioonile olevan peniksen päälle. Tämä on tehtävä ennen kuin peniksen ja kumppanin kehon väillä on mitään kosketusta sukupuoliteitse tartuttavien infektioiden ja raskauden ehkäisemiseksi. (4) Pidä samalla kiinni säiliön päästä ja rullaa kondomi toisella kädellä koko erektsioonile olevan peniksen pituudella. (5) Tarkista, luukeneko kondomi pois peniksestä tai onko se liian tiukka, sinä tai vaimo joutaa väkisin ulos. (6) Pidä siemensyöksyn jälkeen kiinni kondomin reunasta ja vedä penis hitaasti ulos, jos se on vielä pystyssä, jotta kondomi ei lipsahda pois. (7) Poista kondomi peniksestäsi vetämällä se hitaasti pois. On tärkeää, että penis tai käytetty kondomi ei kosketa emättimen alueita postistamisen jälkeen. (8) Käärä käytetty kondomi ja hävitä se hygieeniseit sulletussa roskiksessä.

EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΚΟΝ
 1. Εάν απαιτείται πρόσθετο λιπαντικό, χρησιμοποιήστε λιπαντικό με βάση το νερό. 2. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά με βάση το λάδι, ορυκτέλαιο και κρέμες σώματος, καθώς αυτά αποδυναμώνουν το προβαλκόν και μπορεί να οδηγήσουν σε μετέπειτα ασθένια του προϊόντος. Αυτό ισχύει επίσης για ορισμένα τοπικά φάρμακα που εφαρμόζονται στο πέος ή στον κόλπο. Εάν δεν είστε σίγουροι για την επίδραση του φαρμάκου στο προβαλκόν σε συνδυασμό με το προβαλκόν, ρητήστε το γιατρό ή το φαρμακείο σας. 3. Μην χρησιμοποιείτε το προβαλκόν εάν το υλικό από καουτσούκ είναι καλλώδες ή εύθραστο. Εάν ο σπινθηρικός περιέχει ένα φάρμακο καταπραυνόμης, απορρίψτε το προβαλκόν και χρησιμοποιήστε ένα νέο από άδεια συσκευασία. 4. Σφραγισμένο είναι γιατρό το συντομότερο δυνατό ή τουλάχιστον εντός 72 ωρών εάν ένα προβαλκόν διαρρέει ή σκιστεί κατά τη χρήση. 5. Τα προβαλκόν προορίζονται μόνο για εφάρμοξη χωρίς HIV. Η επαναχρησιμοποίηση των προβαλκόνων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης και μόλυνσης. 6. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά κάθε φορά που κάνετε σεξ, τα προβαλκόνικά από lateξ συμβάλλουν στην πρόληψη της εγκυμοσύνης και μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV/AIDS και άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 7. Καμία μέθοδος αντισύλληξης δεν μπορεί να παρέχει 100% προστασία από την εγκυμοσύνη ή τη μετάδοση του HIV και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Εάν υπονοείτε ότι εισήχθη η ή σύλληψη, σας είχε έγκαιρα ή έχει μολυνθεί, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. 8. Έγκαιρα ή έχει μολυνθεί, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. 9. Έγκαιρα ή έχει μολυνθεί, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. 10. Εάν το προϊόν περιέχει φυσικό λάτεξ το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του αναφυλακτικού σοκ. Εάν είστε αλλεργικοί στα προϊόντα φυσικού lateξ, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση. 9. Φυλάσσετε σε δροσερό και ήπιο μέρος, και προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως. 10. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 11. Όταν υπάρχει κίνδυνος πνιγμού κατά τη χρήση των προβαλκόνικών από το στόμα. 12. Η χρήση πρόσθετων λιπαντικών κατά την πρακτική επαφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης. 13. Τα προβαλκόνικά είναι ένα ιατρικό προϊόν για λίκαιους ανθρώπους - ενήλικες άνδρες ή γυναίκες. 14. Αναφέρετε κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει κατά τη χρήση της συσκευής στον κατασκευαστή ή στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή. 15. Αυτά τα προβαλκόνικά συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Σίχστε προσεκτικά τη συσκευασία με το αλουμίνιο καθαρά, προσέχοντας να μην καταστραφεί το προβαλκόνικό. (2) Κατά την αφαίρεση του φύλλου αλουμινίου, αποφύγετε να καταστραφεί το προβαλκόνικό με νύχια, κομμάρια κ.λπ. (3) Πιέστε απαλά το άκρο της στεφαναδόχου κατάληξης του προβαλκόνικού μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη σας για να αφαιρέσετε τον αέρα από το άκρο, ενώ τοποθετείτε το προβαλκόνικό πάνω στη κεφαλή του σε στύση πέους. Αυτό πρέπει να γίνεται πριν από οποιαδήποτε επαφή μεταξύ του πέους και του σώματος του συντρόφου σας για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων και της εγκυμοσύνης. (4) Εάν κρατάτε το άκρο του ερέθιστου, βεβαιωθείτε ότι το προβαλκόνικό με το άλλο χέρι σε όλο το μήκος του σε στύση πέους. (5) Ελέγξτε αν το προβαλκόνικό γλιστράει από το πέος ή αν είναι πολύ σφιχτό, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη. (6) Μετά την εκπεμπήση, κρατήστε την άκρη του προβαλκόνικού και τράβηξτε αργά το πέος προς τα έξω, ενώ η στύση πέους είναι ακόμα στήση. Αυτό πρέπει να γίνεται πριν από την προβαλκόνικά και πιεζέτε το με υγιεινό τρόπο σε κλειστό απορριμμάτιο.

HR VAŽNE NAPOMENE PRIJE UPOTREBE KONDOMA
 1. Ako je potreban dodatni lubrikant, koristite lubrikant na bazi vode. 2. Nemojte koristiti lubrikante na bazi ulja, mineralna ulja i kreme za tijelo, jer oni mogu oslabiti kondom i uzrokovati naknadni kvar proizvoda. To se također odnosi na neke lokalne lijekove koji se primjenjuju na penis ili vaginu. Ako niste sigurni u učinak lijeka koji koristite zajedno s kondomom, pitajte svog liječnika ili ljekarnika. 3. Ne koristite kondom ako je gumeni materijal ljepljiv ili lomljiv. Ako je pojedinačni pakiranje očito oštećeno, bacite kondom i upotrijebite novi iz neoštećenog pakiranja. 4. Ako kondom prouci ili pukne tijekom korištenja, odmah se obratite svom liječniku. 5. Kondomi su namijenjeni samo za jednokratnu upotrebu. Ponovno upotrebum kondoma mogu povećati rizik od oštećenja i infekcije. 6. Pravilnom upotrebom tijekom svakog spolnog odnosa, lateks kondomi pomažu u sprječavanju trudnoće i smanjenju rizika od prenošenja HIV-a/AIDS-a i drugih spolno prenosivih infekcija. 7. Nijedna metoda kontracepcije ne može pružiti sto posto zaštitu od trudnoće ili prijenosa HIV-a i spolno prenosivih bolesti. Ako sumnjate da ste vi ili vaš partner trudni ili da ste bili zaraženi, odmah se obratite svom liječniku. 8. Ova proizvod sadrži prirodni lateks koji može izazvati alergijske reakcije uključujući anafilaktički šok. Ako ste alergični na proizvode od prirodnog lateksa, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe. 9. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu daleko od zravnog sunčevog svjetlosti. 10. Držite po dalje od djece. 11. Postoji rizik od gušenja pri peroralnoj uporabi kondoma. 12. Koristite dodatnih lubrikanta tijekom analnog odnosa može smanjiti rizik od oštećenja proizvoda. 13. Kondom je medicinski proizvod namijenjeno za laike - odr

HU FŐTÖBBS MEGJEGYZÉSEK AZ ÓDOM HASZNÁLATA ELŐTT
1. Ha további sikótiyónagyra van szükség, használjon vizalapu sikótit.
2. Ne használjon új! alapu sikótitokat, asvnyáj olajokat és testalpu krémeket, mivel ezek gyengikik az óvszert és a termék későbbi megbízósádósához vezethetnek. Ez vonatkozik egyes helyi gyóvszerekre is, amelyek a péniszre vagy a hüvelyre alkalmaznak. Ha bizonytalan az óvszerrel együtt használt gyóvszerek hatásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyóvszerészt.
3. Ne használja az óvszert, ha a gumi anyag ragadó vagy törékeny. Ha az egyedi tartály nyilvánvalón sérült, dobjuk ki az óvszert, és használjon újat a sérítetlen csomagolásból.
4. A lehető legkorábban, de legalább 72 órá elüli forduljon orvoshoz, ha az óvszer használat közben szivárg vagy kiszakad.
5. Az óvszereket csak egyszer használata szánják. Az óvszer újrafelhasználása növelheti a sérülés és a fertőzés kockázatát.
6. A latex óvszer helyes használata esetén minden egyes alkalommal, amikor szexuális kapcsolat létesít, segít megelőzni a terhességet, és csökkenti a HIV/AIDS és más szexuális úton terjedő fertőzések átvitelének kockázatát.
7. Egyetlen fogamzásgátó módszer sem nyújt 100 százalékos védelmet a terhesség, illetve a HIV és a szexuális úton terjedő betegségek átvittele ellen. Ha azt gyanítja, hogy Ön vagy partnere terhes vagy megfertőződött, azonnal forduljon orvosához.
8. Ez a termék természetes latexet tartalmaz, amely allergiás reakciókat okozhat, beleértve az anafilaxiás sokkot is. Ha allergiás a természetes latex terméknek, használat előtt forduljon orvosához.
9. Törálja hűvös, száraz helyen és védje a közvetlen napfénytől.
10. Gyermekektől távol tartandó.
11. Az óvszer szájon át történő használatának fennáll a tudalás veszélye.
12. Az anélis közlésről során további sikótitok használata kösenketheti a sérülés kockázatát.
13. Az óvszer laikusoknak - felnőt férfiaknak vagy nőeknek - szánt orvosi eszköz.
14. Az eszköz használata során bekövetkező súlyos incidenseket jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságknak.
15. Az óvszereket csak egyszer használata szánják. Az óvszer újrafelhasználása növelheti a sérülés és a fertőzés kockázatát.
16. A sérülésen tépje fel a fóliás csomagolást, ügyelve arra, hogy az óvszer ne kerüljön meg.
17. A fólia eltávolításakor kerülje az óvszer sérülését körömmel, éskézerekkel stb.
18. Óvatosan szorítsa össze az óvszer tartályos végét a hüvelyk- és mutatóujja között, hogy eltávolítsa a levegőt a végéből, miközben az óvszert az erekciós pénisz fejére helyezi.
19. Ez a szexuális úton terjedő fertőzések és a terhesség megelőzése érdekében a pénisz és a partner teste közötti bármilyen érintkezés előtt kell elvégezni.
4. Miközben a tartály hegyét tartja, a másik kezével tekerje le az óvszert az erekciós pénisz teljes hosszán.
5. Ellenőrizze, hogy az óvszer nem csúszkál-e a péniszről, vagy nem túl szoros-e, mivel ez sérüléshez vezethet.
6. Ejakuláció után fogja meg az óvszer szélét, és lassan húzza ki a péniszt, miközben az még mindig merov, hogy az óvszer ne csúszson le.
7. Távolítsa el az óvszert a péniszéről úgy, hogy lassan húzza le. Fontos, hogy a pénisz vagy a használt óvszer eltávolítás után ne érjen a hüvely területéhez.
8. Csomagolja be a használt óvszert, és higiénikusan dobjuk ki egy zárt szemetesbe.

LT SVARBŪS PASTABOS PRIEŠ NAUDOJANT PREZERVATYVĄ

1. Jei reikia papildomo lubrikanto, naudokite vandens pagrindo lubrikantą.
2. Nenaudokite aliejinio lubrikantu, mineralinės alyvos ir kūno kremų, nes jie gali susilpninti prezervatyvą ir vėliau sukelti produkto gedimą. Tai taip pat laikoma kai kuriems vietiniams vaistams, kurie tepami ant varpos ar makšties. Jei nesate tikri dėl vaistų, kuriuos vartojate kartu su prezervatyvais, poveikiu, pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku.
3. Nenaudokite prezervatyvo, jei guminė medžiaga yra lipni arba trapta. Jei atskiras prezervatyvas yra akivaizdžiai pažeistas, išmeskite jį ir naudokite naują iš nepažeistos pakuotės.
4. Jei prezervatyvas prakiuro arba plyšo naudojimo metu, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 valandas, kreipkitės į gydytoją.
5. Prezervatyvą skirti naudoti tik vieną kartą. Pakartotinai naudojami prezervatyvai gali padidinti pažeidimų tikimybės riziką.
6. Tinkamai naudojami kiekvieno lytinio akto metu, latekso prezervatyvai padeda išvengti nėštumo ir sumažina ŽIV/AIDS bei kitų lytiniu keliu plintančių infekcijų ligų perdavimo riziką.
7. Nė vienas kontracetpcijos metodas negali užtikrinti 100 % apsaugos nuo nėštumo ar ŽIV ir lytiniu keliu plintančių ligų perdavimo. Jei žiniate, kad esate nėščia arba užsikrėtė, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
8. Šis produktas yra natūralaus latekso, kuris gali sukelti alergines reakcijas, įskaitant anafilaksinį šoką. Jei esate alergiškas natūralaus latekso produktams, prieš naudojimą kreipkitės į gydytoją.
9. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo tiesioginio saulės spindulių.
10. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
11. Naudojant prezervatyvus oraliniam seksui, galima sumažinti pažeidimų riziką.
12. Prezervatyvas yra medicinos produktas, skirtas suaugusiems vyrams arba moterims.
14. Apie visus rimtus incidentus, susijusius su šio produkto naudojimu, praneškite gamintojui ir atitinkami kompetentingai institucijai.
15. Šios prezervatyvos atitinka tarptautinius standartus ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Atsargiai aplėpkite plėvelę, stengiamiesi nepažeisti prezervatyvos.
(2) Nuimdami plėvelę, stenkitės nepažeisti prezervatyvos nagais, papuošalais ir pan.
(3) Atsargiai suspaudžiant prezervatyvo rezervuaro galą tarp nykščio ir rodomojo piršto, išstumkite orą iš prezervatyvo glo, o prezervatyvą užkėbtė ant erekcijs pasiekusio varpos galvutės. Tai reikia padaryti prieš varpos ir partnerio kūno kontaktą, siekiant išvengti lytinio keliu plintančių infekcijų ir nėštumo.
(4) Laikydami rezervuaro galą, kita ranka prezervatyvą užmaukite ant viso erekcijs varpos ligo.
(5) Patikrinkite, ar prezervatyvas neslysta nuo varpos, nėra tam pernelyg lėptas, nes tai gali į pažeisti.
(6) Po ejakuliacijos laikykite prezervatyvą kraštin ir lėtai ištraukite varpą, kol ji dar yra erekcijs būsenoje, kad prezervatyvas nenuslystų.
(7) Numikite prezervatyvą nuo varpos, lėtai jį nuimant. Svarbu, kad varpa ar naudotas prezervatyvas po nuėmimo neliesdamas makšties srities.
(8) Naudotą prezervatyvą suvyniokite ir higiéniskai išmeskite į uždara šiukšlinėdžė.

LV SVARĀGI INFORMĀCIJA, KAS JĀZINA PIRMS PREZERVĀTĪVAS LIETOŠANĀS

1. Ja nepieciešams papildu lubrikantu, lietojiet ūdens bāzes lubrikantu.
2. Neļietojiet eļļas bāzes lubrikantus, minerālēļas un ķermeņa krēmus, jo tie var vājināt prezervatīvu un izraisīt tā bojāšanos. Tas attiecas arī uz daudzi lokālām medikamentiem, ko uzskāt uz dzimumlocekļa vai maksts. Ja neesat pārliecināts par to medikamentu iedarbību, kurus lietojat kopā ar prezervatīvu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
3. Neļietojiet prezervatīvu, ja gumijas materiāls ir lipīgs vai trausls. Ja atsevišķs iepakojums ir 4. Ja prezervatīvs lietošanas laikā izplūst vai pārsprāgst, iespējams ir arī vismaz 72 stundu laikā vērtiesies pie ārsta.
5. Prezervatīvu ir paredzēti vienreizējai lietošanai. Atkārtoti lietoti prezervatīvu var palielināt bojājumu un infekciju risku.
6. Pareizi lietojot katrā dzimumaktā, latekसा prezervatīvu palīdz novērst grūtniecību un samazina HIV/AIDS un citu seksuāli transmisīvo infekciju pārnešanas risku.
7. Nevienā kontracepcijas metode nevar nodrošināt simprocentīgu aizsardzību pret grūtniecību vai HIV un seksuāli transmisīvo slimību pārēšanu. Ja Jums ir aizdomas, ka Jūs vai Jūsu partneris esat stāvoklī vai inficējis, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
8. Šis produkts satur dabisko lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, tostarp anafilaktisku šoku. Ja Jums ir alerģija pret dabiskā latekसा produktiem, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.
9. Uzglabājiet vied, sausā vietā, pasargāt no tiešas saules gaismas.
10. Gīabāt bērnu nepieejamā vietā.
11. Prezervatīvu lietošana mājās var izraisīt nosmakšānu.
12. Papulū lubrikantu lietošana anālis seksā laikā var samazināt bojājumu risku.
13. Prezervatīvu ir medicānas izstrādājums pieaugušiem vīriešiem vai sievietēm.
14. Par jebkuru nopietnu stargardījumu, kas rodas, lietojot šo izstrādājumu, ziņojiet ražotājam un atbēgļai iestādei.
15. Šie prezervatīvi atbēst starptautiskajam standartam ISO 4074 / EN ISO 4074.
(1) Uzmaniģti atvērt iepakojumu, uzmanoties, lai prezervatīvs netiktu bojāts.
(2) Noņemot plēvi, izvairieties no prezervatīva bojājumiem ar nagiem, rolasietām utt.
(3) Uzlieciet prezervatīvu uz erekcijs sasniegšā dzimumlocekļa galvas un uzmanīgi paspiediet prezervatīva rezervuāra galu starp iķķi un rādītājpirkstu, lai izlaistu gaisu no gīa. Tas jādarā pirms dzimumlocekļa saskars ar partnera ķermeni, lai novērstu seksuāli transmisīvas infekcijas un grūtniecību.
(4) Turiet rezervuāra galu un ar otro roku uzlieciet prezervatīvu uz visa erekcijs locekļa garumā.
(5) Pārbaudiet, vai prezervatīvs nav noslīdējis no locekļa vai nav pārāk cieši pieguļus, jo tas var izraisīt bojājumus.
(6) Pēc ejakulācijas lēni prezervatīvu malā nēlēm izvelciet dzimumlocekli, kamēr tas vēl ir erekcijs, lai prezervatīvs nenokrītu.
(7) Noņemiet prezervatīvu no dzimumlocekļa, lēnām to novīkt. Ir svarīgi, lai dzimumloceklis vai izmantotās prezervatīvs pēc noēmans nesaskartos ar maksts zonu.
(8) Neliet izlietoto prezervatīvu un izmetiet to higiéniski slēgtā atkritumu tvērnē.

NL BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR HET GEBRUK VAN EEN CONDOM

1. Als extra glijmiddel nodig is, gebruik dan glijmiddel op waterbasis.
2. Gebruik geen glijmiddelen op oliebasis, minerale olie en bodycrems, omdat deze het condoom kunnen aantasten en er later tot defecten kunnen leiden. Dit geldt ook voor sommige topische medicijnen die op de penis of vagina worden aangebracht.
Als je niet zeker bent van het effect van de medicatie die je gebruikt in combinatie met condoms, vraag het dan aan je arts of apotheker.
3. Gebruik het condoom niet als het rubberen materiaal plakkend of broos is.
Als de individuele verpakking duidelijk beschadigd is, gooi het condoom dan weg en gebruik een nieuwe uit een onbeschadigde verpakking.
4. Raadpleeg zo snel mogelijk of in ieder geval binnen 72 uur een arts als een condoom lekt of ernstig tijdens gebruik is.
5. Condooms zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.
Hergebruik van condooms kan het risico op beschadiging en infectie vergroten.
6. Als latex condooms elke keer dat je seks hebt contact worden gebruikt, helpen ze zwangerschap te voorkomen en verminderen ze het risico op overdracht van hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.
7. Geen enkele anticonceptiemethode kan 100% bescherming bieden tegen zwangerschap of overdracht van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen.
Als u vermoedt dat u of uw partner zwanger bent of besmet is geraakt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
8. Dit product bevat natuurlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, waaronder een anafilactische shock.
Als u allergisch bent voor natuurlatexproducten, raadpleeg dan voor gebruik uw arts.
9. Bewaar op een koele, droge plaats en bescherm tegen direct zonlicht.
10. Buiten bereik van kinderen bewaren.
11. Er is een risico op verstikking bij oraal gebruik van condooms.
12. Het gebruik van extra glijmiddelen tijdens anale seks kan het risico op beschadiging verminderen.
13. Een condoom is een medicijn hulpmiddel voor leken - volwassen mannen of vrouwen.
14. Elk ernstig incident dat zich voordoet tijdens het gebruik van het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de relevante bevoegde autoriteit.
15. Deze condooms voldoen aan de internationale normen ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Schuur de beschermingskoning voorzichtig open en zorg ervoor dat u het condoom niet beschadigt.
(2) Vermijd bij het verwijderen van de folie beschadiging van het condoom met vingernagels, sieraden, etc.
(3) Krijp het reservoirtende van het condoom zachts tussen duim en wijsvinger om de lucht uit het topje te verwijderen terwijl je het condoom over de eikel plaatst. Dit moet gebeuren voordat er contact is tussen de penis en het lichaam van je partner om seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschap te voorkomen van de stilje penis.
(4) Terwijl je de top van het reservat vasthoudt, rol je met de andere hand het condoom af over de hele lengte.
(5) Controleer of het condoom van de penis glijft of te strak zit, want dit kan leiden tot beschadiging.
(6) Houd na de zaadlossing de rand van het condoom vast en trek de penis langzaam naar buiten terwijl hij nog is stijf, zodat het condoom niet afglijdt.
(7) Verwijder het condoom van je penis door het langzaam los te trekken. Het is belangrijk dat de penis of het gebruikte condoom het vaginale gebied niet raakt na het verwijderen.
(8) Verpak het gebruikte condoom en gooi het hygiënisch weg in een gesloten afvalbak.

NO VIKTIGE BEMERKNINGER FØR DU BRUKER KONDOM

1. Hvis det er behov for ekstra glideemiddel, bruk vannbasert glideemiddel.
2. Ikke bruk oljebaserte glideemidler, mineralolje eller kroppskrem, da disse kan svekke kondomet og føre til at produktet svikter senere. Dette gjelder også for noen aktuelle medisiner som brukes på penis eller i skeden. Hvis du er usikker på effekten av medisinen du bruker sammen med kondomet, bør du spørre legen din eller apoteket.
3. Ikke bruk kondomet hvis gummitetningen er klebrig eller sprøtt.
4. Når du bruker kondomet er åpenbart skadet, kast kondomet og bruk et nytt fra en uskadet emballasje.
4. Oppsett lege så snart som mulig eller, i det minste innen 72 timer hvis kondomet lekker eller sprøtt etter bruk.
5. Kondomer er kun beregnet til engangsbruk. Gjennbruk av kondomer kan øke risikoen for skader og infeksjoner.
6. Når kondomer av lateks brukes på riktig måte hver gang du har sex, bidrar de til å forebygge graviditet og redusere risikoen for overføring av hiv/aids og andre seksuelt overførbare infeksjoner.
7. Ingen prevensjonsmetode kan gi 100 prosent beskyttelse mot graviditet eller overføring av hiv og seksuelt overførbare sykdommer. Hvis du mistenker at du eller partneren din er gravid eller har blitt smittet, må du kontakte legen din umiddelbart.
8. Dette produktet inneholder naturlig lateks som kan forårsake allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktisk sjokk. Hvis du er allergisk mot naturlige lateks-produkter, må du kontakte legen din før bruk.
9. Oppbevares på et kjølig, tørt sted og beskyttes mot direkte sollys.
10. Holdes borte fra barn.
11. Det er farer for kvelling ved bruk av kondomer oralt.
12. Bruk av ekstra glideemiddel under anal samleie kan redusere risikoen for skade.
13. Kondomer er et medisinsk utstyr for lekfolk - voksne menn eller kvinner.
14. Rapporter enhver alvorlig hendelse som oppstår under bruk av utstyret, til produsenten og der relevante kompetente myndigheter.
15. Disse kondomene er i samsvar med de internasjonale standardene ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Åpne foliepakningen forsiktig, og pass på at kondomet ikke skades.
(2) Ungå å klistre kondomet med negler, smykker osv. når du fjerner folien.
(3) Klem forsiktig reservoaren av kondomet mellom tommel og pekefinger for å fjerne luften fra tuppen mens du plasserer kondomet over hodet på den erigerte penis. Dette må gjøres før det er kontakt mellom penis og partners kropp for å forhindre seksuelt overførbare infeksjoner og graviditet.
(4) Mens du holder i kondomet, hold det åpne enden med den andre hånden over hodet på den erigerte penis.
(5) Kontroller om kondomet glijr av penis eller er stramt, da dette kan føre til skade.
(6) Etter utløsning, hold i kanten av kondomet og trekk penis sakte ut mens den fortsatt er erigert, slik at kondomet ikke sklir av.
(7) Fjern kondomet fra penis ved å trekke det sakte av. Det er viktig at penis eller brukt kondomet ikke kommer i berøring med skjeden etter at det er fjernet.
(8) Prøkt inn det brukte kondomet og kast det på en hygienisk måte i en lukket søppelbette.

PL WAŻNE UWAGI PRZED UŻYCIEM PREZERVATYWY

1. Jeśli wymagany jest dodatkowy lubrykant, należy użyć lubrykantu na bazie wody.
2. Nie używaj lubrykantów na bazie oleju, olejów mineralnych ani kremów do ciała, ponieważ mogą one osłabić prezervatywy i doprowadzić do jej pęknięcia. Dotyczy to również niektórych leków stosowanych miejscowo na penis lub pochwie.
Jeśli nie masz pewności co do działania leku stosowanego w połączeniu z prezervatywami, zapytaj lekarza lub farmaceutę.
3. Nie używaj prezervatyw, jeśli gumowy materiał jest bałki lub kruchy. Jeśli opakowanie jest w oczywisty sposób uszkodzone, należy wyrzucić prezervatywy i użyć nowej prezervatywy z nieuszkodzonego opakowania.
4. Jeśli prezervatywa przecieka lub pęknie podczas stosowania, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, a przynajmniej w ciągu 72 godzin.
5. Prezervatywy są przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.
Ponowne użycie prezervatyw może zwiększyć ryzyko uszkodzenia i zakażenia.
6. Prezervatywy lateksowe stosowane prawidłowo podczas każdego stosunku płciowego pomagają zapobiegać ciąży i zmniejszają ryzyko przeniesienia HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową.
7. Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia stuoprocentowy ochrony przed ciążą lub przeniesieniem wirusa HIV i chorób przenoszonych drogą płciową.
Jeśli podejrzewasz, że ty lub twój partner jestem z ciąży lub zostaliście zarazieli, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
8. Ten produkt zawiera naturalny lateks, który może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Jeśli jesteś uczulony na produkty z naturalnego lateksu, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
9. Prezerwatywy w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
10. Trzymaj z dala od dzieci.
11. Istnieje ryzyko zadawienia podczas doustnego stosowania prezervatyw.
12. Stosowanie dodatkowych lubrykantów podczas stosunku analnego może zmniejszyć ryzyko uszkodzenia.
13. Prezervatywy jest wyrobem medycznym przeznaczonym dla osób świeckich - dorosłych mężczyzn lub kobiet.
14. Należy zgłaszać wszelkie poważne incydenty, które wystąpiły podczas korzystania z wyrobu, producentowi i odpowiedniemu właściwemu organowi.
15. Te prezervatywy są zgodne z międzynarodowymi normami ISO 4074 / EN ISO 4074.

(1) Ostrożnie rozwarć folię opakowania, uważając, aby nie uszkodzić prezervatyw.
(2) Podczas usuwania folii należy unikać uszkodzenia prezervatyw przytknięciami, biżuterią itp.
(3) Dokładnie sprawdź końcówkę zbiornika prezervatywu między kciukiem a palcem wskazującym, aby usunąć powietrze z końcówki, jednocześnie nakładając prezervatywa na głowę penisu we wzdożnie. Należy to zrobić przed jakimkolwiek kontaktem penisu z ciałem partnerki, aby zapobiec przeniesieniu przenoszonym drogą płciową ciąży.
(4) Przytrzymując końcówkę zbiornika, rozwinąć prezervatyw używając drugiej ręki na całej długości penisu w stronę wzdożu.
(5) Sprawdź, czy prezervatywa nie zsuwa się z penisu lub nie jest zbyt ciasna, ponieważ może to prowadzić do jej uszkodzenia.
(6) Po wyniku należy przytrzymać stawie prezervatywy i powoli wyściągnąć penis, gdy jest on nadal w stanie wzdożu, aby prezervatywa nie zsunęła się.
(7) Zdejmij prezervatywy z penisu, ściągając ją powoli. Ważne jest, aby no zdjęciu prezervatywy penis ani zużyta prezervatywa nie dotykały pochwy.
(8) Zawiń zużyta prezervatywy i wyrzuć ją w higieniczny sposób do zamkniętego kosza na śmieci.

PT CONSELHOS IMPORTANTES ANTES DE UTILIZAR UM PRESERVATIVO

1. Se for necessário lubrificante adicional, utilize lubrificante à base de água.
2. Não utilize lubrificantes à base de óleo, óleo mineral e cremes corporais, pois estes enfraquecem o preservativo e podem causar uma falha posterior do produto. Isto também se aplica a alguns medicamentos tópicos que são aplicados no pênis ou na vagina. Se não tiver a certeza sobre o efeito do medicamento que está a utilizar em conjunto com o preservativo, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.
3. Não utilize o preservativo se o material de borracha estiver pegajoso ou quebradiço.
3. Se a embalagem individual estiver manifestamente danificada, detar fora o preservativo e utilize um novo de uma embalagem não danificada.
4. Consultar um médico o mais rapidamente possível ou, pelo menos, no prazo de 72 horas, se um preservativo tiver uma fuga ou rebitar durante a utilização.
5. Os preservativos destinam-se a uma única utilização. A reutilização dos preservativos pode aumentar o risco de danos e de infeção.
6. Quando usados corretamente, ajudam a prevenir a tem lema reações sexuais, os preservativos de látex ajudam a prevenir a gravidez e a reduzir o risco de transmissão do VIH/SIDA e de outras infeções sexualmente transmissíveis.
7. Nenhum método contraceutivo pode proporcionar 100% de proteção contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de doenças sexualmente transmissíveis. Se suspeitar que você ou a sua parceira estão grávidas ou foram infectadas, contacte imediatamente o seu médico.
8. Este produto contém látex natural, que pode causar reacções alérgicas, incluindo choque anafilático. Se for alérgico a produtos de látex natural, consulte o seu médico antes de os utilizar.
9. Guarde num local fresco e seco e proteja da luz solar direta.
10. Mantê-lo afastado do alcance das crianças.
11. Existe o risco de asfixia quando se utilizam preservativos por via oral.
12. A utilização de lubrificantes adicionais durante o ato sexual anal pode reduzir o risco de danos.
13. Um preservativo é um dispositivo médico para homens - homens ou mulheres adultos.
14. Comunicar qualquer incidente que ocorra durante a utilização do dispositivo ao fabricante e à autoridade competente relevante.
15. Estes preservativos estão em conformidade com as normas internacionais ISO 4074 / EN ISO 4074.
(1) Folioj predvidno odprti in pazite, da kondom ne poškodujete.
(2) Pri odstranjevanju folije pazite, da kondom ne poškodujete za nohti, naklioni itd.
(3) Konico kondoma previdno stisnite med palcem in kazalcem, da iz njega iztisnete zrak, medtem ko kondom natekate na glavico erekcije. To je treba storiti, preden pride do stika med penisom in telesom partnerja, da se preprečijo spolno prenosljive okužbe in nosečnost.
(4) Medtem ko držite konico rezervuarja, z drugo roko kondom razvijte po celotni dolžini erekcije penisja.
(5) Preverite, ali kondom ne zdrsne s penisja ali ni preveč tesno nameščen, saj lahko to povzroči poškodbo.
(6) Po ejakulaciji primate rob kondoma in penis počasi izvelcite, dokler je še erekcijs, da se kondom ne zdrsne.
(7) Kondom s penisja odstranite tako, da ga počasi potegnete navzdol. Pomembno je, da penis ali uporabljen kondom po odstranitvi ne pride v stik z vaginalnim območjem.
(8) Uporabljen kondom zavijte in ga higienično odvžajte v zaprt koš za smeti.

RO INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE ÎNAINTE DE UTILIZAREA UNUI PREZERVATIV

1. Dacă este necesar lubrifianți suplimentari, utilizați lubrifianți pe bază de apă.
2. Nu utilizați lubrifianți pe bază de ulei, ulei mineral și creme pentru corp, deoarece acestea pot slăbi prezervativul și pot duce la defectarea ulterioară a produsului. Acest lucru este valabil și pentru unele medicamente topice care sunt aplicate pe penis sau vagin.
Dacă nu sunteți sigur de efectele medicamentului pe care le utilizați împreună cu prezervativul, întrebați medicul sau farmacistul.
3. Nu utilizați prezervativul dacă materialul de cauciuc este tipicuos sau fragil.
Dacă ambalajul individual este deteriorat / în mod evident, aruncați prezervativul și utilizați unul din ambalajul nedeteriorat.
4. Consultați un medic cât mai curând posibil în cazul cel puțin în termen de 72 de ore dacă un prezervativ curge sau se sparge în timpul utilizării.
5. Prezervativul este destinat unei singure utilizări. Reutilizarea prezervativelor poate crește riscul de deteriorare și infectare.
6. Nu utilizați când sunteți utilizate corect de ficare dată când aveți relații sexuale, prezervativul din latex ajută la prevenirea sarcinii și reduce riscul de transmitere a HIV/SIDA și a altor infecții cu transmitere sexuală.
7. Nicio metodă de contracepție nu poate oferi protecție 100% împotriva sarcinii sau a transmiterii HIV și a bolilor cu transmitere sexuală.
Dacă suspectați că dvs. Sau partenerul dvs. sunteți gravida sau ați fost infectată, contactați imediat medicul dumneavoastră.
8. Acest produs conține latex natural care poate provoca reacții alergice, inclusiv șoc anafilactic. Dacă sunteți alergic la produsele din latex natural, consultați medicul înainte de utilizare.
9. Depozitați într-un loc răcoros, uscat și protejat/ de lumina directă a soarelui.
10. Timpul de utilizare este de cel puțin 11. există riscul de sufocare la utilizarea prezervativelor pe cale orală.
12. Utilizarea de lubrifianți suplimentari în timpul actului sexual anal poate reduce riscul de deteriorare.
13. Un prezervativ este un dispozitiv medical pentru utilizare personală și este destinat utilizării prezervativului cu autoritatea competentă în cazurile de incident grav care apare în timpul utilizării prezervativului.
15. aceste prezervativuri sunt conforme cu standardele internaționale ISO 4074 / EN ISO 4074.
(1) Rupeti cu grijă ambalajul din folie, având grijă să nu deteriorați prezervativul.
(2) Atunci când îndepărtați folia, evitați să deteriorați prezervativul cu unghieile, bijuteriile etc.
(3) Strângeți ușor capătul rezervorului prezervativului între degetul mare și arătător pentru a elimina aerul din vîrf în timp ce plasați prezervativul pe capul penisului în erecție. Acest lucru trebuie făcut înainte de a exista orice contact între penis și corpul partenerului pentru a preveni infecție cu transmitere sexuală și sarcina.
(4) În timp ce țineți vârful rezervorului, derulați prezervativul cu ceaală mână pe întregua lungime a penisului în erecție.
(5) Verificați dacă prezervativul alunecă de pe penis sau este prea (6) După ejaculare, țineți marginea prezervativului și trageți înțel penisul în timp ce acesta este încă erect, astfel încât prezervativul să nu alunecă.
(7) Scoateți prezervativul de pe penis trăgându-l înăoi. Este important ca penisul sau prezervativul folosit să nu atingă zona vaginală după îndepărtare.
(8) Înăsuțuri prezervativul folosit și aruncați-l în mod igienic într-un cos de gună închis.

SL POMEMBNE NAVODILA PRED UPORABO KONDOMA

1. Če je potrebno dodatno mazivo, uporabite mazivo na vodni osnovi.
2. Ne uporabljajte lubrikantov na oljni osnovi, mineralnega olja in krem za telo, saj lahko oslabijo kondom in povzročijo pozejšje okvaro izdelka. To velja tudi za nekatera lokalna zdravila, ki se nanašajo na penis ali vagino. Če niste prepričani o učinku zdravila, ki jih uporabljate v povezavi s kondomom, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.
3. Kondoma ne uporabljajte, če je gumijasti material zrvnil ali krhek. Če je posamezna embalaža občutno poškodovana, kondom zavrzite in uporabite novega iz nepoškodovane embalaže.
4. Če kondom med uporabo pušča ali počne, čim prej ali najpozneje v 72 urah poiščite zdravniško pomoč.
5. Kondomi so namenjeni za enkratno uporabo. Ponovna uporaba kondomov lahko poveča tveganje za okužbo in okužb.
6. Pri pravilni uporabi pri vsakem spolnem odnosu lateksni kondomi pomagajo preprečiti nosečnost in zmanjšujejo tveganje za prenos HIV in spolno prenosljivih bolezni.
7. Nobena metoda kontracepcije ne zagotavlja 100-odstotne zaščite pred nosečnostjo ali prenosom HIV in spolno prenosljivih bolezni. Če sumite, da ste vi ali vaš partner noseči ali okuženi, se takoj obrnite na svojega zdravnika.
8. Ta izdelek vsebuje naravni lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije, vključno z anafilaktičnim šokom. Če ste alergični na izdeleke iz naravnega lateksa, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
9. Hranite na hladnem, suhem mestu in zaščiten pred nepredeno sončno svetlobo.
10. Hranite izven dosega otrok.
11. Pri oralni uporabi kondomov obstaja nevarnost zadušitve.
12. Uporaba dodatnih lubrikantov pri analnem spolnem odnosu lahko zmanjša tveganje za poškodbo.
13. Kondom je medicinski pripomoček za odrasle moške ali ženske.
14. Vsak resen incident, ki se pojavi med uporabo izdelka, prijavite proizvajalcu in pristojnim organom.
15. Ti kondomi so v skladu z mednarodnimi standardi ISO 4074 / EN ISO 4074.
(1) Folioj predvidno odprti in pazite, da kondom ne poškodujete.
(2) Pri odstranjevanju folije pazite, da kondom ne poškodujete za nohti, naklioni itd.
(3) Konico kondoma previdno stisnite med palcem in kazalcem, da iz njega iztisnete zrak, medtem ko kondom natekate na glavico erekcije. To je treba storiti, preden pride do stika med penisom in telesom partnerja, da se preprečijo spolno prenosljive okužbe in nosečnost.
(4) Medtem ko držite konico rezervuarja, z drugo roko kondom razvijte po celotni dolžini erekcije penisja.
(5) Preverite, ali kondom ne zdrsne s penisja ali ni preveč tesno nameščen, saj lahko to povzroči poškodbo.
(6) Po ejakulaciji primate rob kondoma in penis počasi izvelcite, dokler je še erekcijs, da se kondom ne zdrsne.
(7) Kondom s penisja odstranite tako, da ga počasi potegnete navzdol. Pomembno je, da penis ali uporabljen kondom po odstranitvi ne pride v stik z vaginalnim območjem.
(8) Uporabljen kondom zavijte in ga higienično odvžajte v zaprt koš za smeti.

SK DŔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRED POUŽITĀM KONDOMU

1. Ak je potrebné ďalšie mazivo, použite mazivo na báze vody.
2. Nepoužívajte lubrikanty na báze oleja, minerálne oleje ani telové krémy, pretože môžu oslabiť kondom a spôsobiť neskoršie zlyhanie produktu. To platí aj pre niektoré lokálne lieky, ktoré sa aplikujú na penis alebo vagínu. Ak si nie ste istí účinkom lieku, ktorý používate v kombinácii s kondomom, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárniky.
3. Kondom nepoužívajte, ak je gumový materiál lepkavý alebo krehký. Ak je jednotlivé balenie zjavne poškodené, kondom zlikvidujte a použite nový z nepoškodeného balenia.
4. Ak kondom počas používania presakuje alebo praskne, čo najskôr alebo aspoň do 72 hodín vyhľadajte lekára.
5. Kondomý sú určené len na jednorazové použitie. Opätovné použitie kondomóv môže zvýšiť riziko poškodenia a infekcie.
6. Pri správnom používaní pri každom pohlavnom styku latexové kondomy pomáhajú predchádzať tehotenstvu a znižujú riziko prenosu HIV/AIDS a iných pohlavne prenosných infekcií.
7. Žiadna antikoncepčná metóda nemôže poskytnúť 100 % ochranu pred tehotenstvom alebo prenosom HIV a pohlavne prenosných chorôb. Ak máte podozrenie, že vy alebo váš partner ste tehotná alebo ste si infekovali, okamžite kontaktujte svojho lekára.
8. Tento výrobok obsahuje prírodný latex, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie vrátane anafylaktického šoku. Ak ste alergický na latex, pred použitím latexu / Inneholder naturig latex / Zaviera naturalny latex / Contem latex de borracha natural / Contine latex natural / Содержит натуральны latex / Vsebuje naravni lateks / Obsahuje prírodný latex / Innehälter naturig latex / Doğal latex natural / Existenze riziko zadusenja.
12. Používání pralohádných lubrikantů počas analného styku môže znížiť riziko poškodenia.
13. Kondom je zdravotnícka pomôcka pre neprofesionálov - dospelych mužov alebo ženy.
14. Každý závažný incident, ktorým dojde počas používania kondomu, nahláste výrobcom a príslušnému orgánu.
15. Ieelo kondomý sú v súlade s medzinárodnými normami ISO 4074 / EN ISO 4074.
(1) Opamte rozbitrhitel fólie balení, având grijă să nu deteriorați prezervativul.
(2) Pri odstranjevanju folie pazite, da kondom ne poškodujete za nohty, naklioni itd.
(3) Določite konico kondoma previdno stisnite med palcem in kazalcem, da iz njega iztisnete zrak, medtem ko kondom natekate na glavico erekcije. To je treba storiti, preden pride do stika med penisom in telesom partnerja, da se preprečijo spolno prenosljive okužbe in nosečnost.
(4) Medtem ko držite konico rezervuarja, z drugo roko kondom razvijte po celotni dolžini erekcije penisja.
(5) Preverite, ali kondom ne zdrsne s penisja ali ni preveč tesno nameščen, saj lahko to povzroči poškodbo.
(6) Po ejakulaciji primate rob kondoma in penis počasi izvelcite, dokler je še erekcijs, da se kondom ne zdrsne.
(7) Kondom s penisja odstranite tako, da ga počasi potegnete navzdol. Pomembno je, da penis ali uporabljen kondom po odstranitvi ne pride v stik z vaginalnim območjem.
(8) Uporabljen kondom zavijte in ga higienično odvžajte v zaprt koš za smeti.

SV VIKTIGA ANMÄRKNINGAR FÖRE ANVÄNDNING AV KONDOM

1. Om ytterligare glideämdeel behövs, använd vattenbaserat glideämdele.
2. Använd inte oljebaserade glideämdele, mineralolja eller kroppskrämer, eftersom dessa kan försvaga kondomet och leda till att produkten senare slutar fungera. Detta gäller även vissa utvärtes mediciner som appliceras på penis eller vagina. Om du är osäker på effekten av de mediciner du använder tillsammans med kondomet, fråga din läkare eller apotekspersonal.
3. Använd inte kondomen om gummitetningen är klabbigt eller sprött. Om den enskilda behållaren är uppenbart skadad, kassera kondomen och använd en ny från en oskadad förpackning.
4. Kontakta läkare så snart som möjligt eller åtminstone inom 72 timmar om kondomen läcker eller spricker under användning.
5. Kondomer är endast avsedda för engångsbruk. Återanvändning av kondomer kan öka risken för skador och infektioner.
6. När latekskondomer används på rätt sätt varje gång du har sex hjälper de till att förhindra graviditet och minskar risken för överföring av hiv/aids och andra sexuellt överförbara infektioner.
7. Ingen preventivmetod kan ge 100-procentig skydd mot graviditet eller överföring av hiv och sexuellt överförbara sjukdomar. Om du mistänker att du eller din partner är gravid eller har blivit smittad ska du omedelbart kontakta din läkare.
8. Denna produkt innehåller naturlateks som kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock. Om du är allergisk mot produkter av naturlateks ska du rådgöra läkare före användning.
9. Förvara på en sval, torr plats och skydda mot direkt solljus.
10. Hålls borta från barn.
11. Det finns risk för kvävning när kondomer används oralt.
12. Användning av extra glideämdele vid anala samlag kan minska risken för skador.
13. En kondom är en medicinteknisk produkt för lekman - vuxna män eller kvinnor.
14. Rapportera alla allvariga incidenter som inträffar under användning av produkten till tillverkaren och den relevanta behöriga myndigheten.
15. Dessa kondomer överensstämmer med de internationella standarderna ISO 4074 / EN ISO 4074.
(1) Riv försiktigt upp folieförpackningen och se till att kondomen inte skadas.
(2) Undvik att skada kondomen med naglar, smycken etc. när du tar bort folien.
(3) Pressa försiktigt kondomens reservoaren mellan tummen och pekefinger för att avlägsna luften från spelsen medan kondomen placeras över huvudet på den erigerade penisen. Detta måste göras innan det finns något kontakt mellan penis och din partners kropp för att förhindra sexuellt överförbara infektioner och graviditet.
(4) Håll i reservoarens spels och rulla ut kondomen med den andra handen över hela den erigerade penisens längd.
(5) Kontrollera om kondomen glijer av penis eller är för hårt kondomager, eftersom detta kan leda till skador.
(6) Efter utlösningen ska du hålla i ändkanten samt och långsamt dra ut penis medan den fortfarande är erigerad, så att kondomet inte glijer av.
(7) Ta bort kondomen från penis genom att dra av den långsamt. Det är viktigt att penis eller den använda kondomen inte vidrör vaginan efter att den har tagits av.
(8) Slå in den använda kondomen och kasta den på ett hygieniskt sätt i en sluten soptunna.

	Keep Dry / Trocken halten / Garder sec / Tenere asciutto / Mantener seco / Суханаванне на сухо / Udržujte v suchu / Hold dig tørt / Hoida kuivas / Pidki kuivana / Krapljute to otvucu / Čuvati na suhom / Szárzand tartani / Laikyti sausoje vietoje / Saglabāt sausa vietā / Droog houden / Halder seig tørt / Utzīrmyvams v suchošā / Mānter seco / Pāstrāj uscat / Хранить в сухом месте / Hranite na suhom / Udržujte v suchu / Håller torr / Kuru tutun / Зберігати в сухому місці